

MRI enterografie

Jouw veiligheid is belangrijk

Verwittig ons wanneer je:

- een pacemaker, gehoorimplantaat of neurostimulator hebt;
- metalen voorwerpen in het lichaam hebt: hartkleppen, vaatclips, plaatjes of schroeven, gewrichtsprothesen, kaakimplantaten;
- (mogelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft;
- last hebt van claustrofobie;
- lijdt aan groene staar (glaucoom) of prostaathypertrofie;
- allergisch bent aan gadolinium, jodium of andere allergieën hebt;
- metaal bewerkt als beroep of hobby.

Indien één van bovenstaande punten voor jou van toepassing is, gelieve zo snel mogelijk telefonisch contact op te nemen met de dienst medische beeldvorming op het telefoonnummer 03 380 20 60.

Vorbereiding

- Gebruik geen haarlak of make-up.
- Haarspelden, sieraden, hoorapparaten, piercings moeten verwijderd worden alvorens het onderzoek kan starten.
- Vul thuis de vragenlijst in en neem deze mee naar de afdeling op de dag van het onderzoek.
- Je moet 4 uur **nuchter** zijn (medicatie innemen mag wel). Je mag dus niet meer eten, drinken of roken vanaf 4 uur voor het onderzoek.
- Je moet één uur op voorhand aanwezig zijn om de nodige voorbereidingen te treffen.

Over het onderzoek zelf

Je krijgt een schortje om aan te doen tijdens het onderzoek. Eigen kleding is niet toegelaten. Je mag je kousen en slip wel aanhouden. Vrouwen dienen ook de BH uit te doen.

Tijdens het onderzoek lig je op een tafel die langzaam in een tunnel wordt geschoven terwijl je op je buik ligt. De voor- en achterkant van de tunnel zijn open. Van de magnetische golven voel je niets, maar het maken van de MRI gaat gepaard met een luid bonkend geluid. Daarom krijg je een hoofdtelefoon.

Tijdens het onderzoek kan je contact houden met de medische beeldvormer die jou de hele tijd op een monitor ziet. Het is van belang om zo stil mogelijk te liggen en zoveel mogelijk te ontspannen.

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 20 minuten.



Goed om weten

Bij de MRI enterografie wordt de dunne darm zichtbaar gemaakt met behulp van een kleurstof (contrastvloeistof) en een suikeroplossing. De suikeroplossing (+/- 2 liter) drink je binnen een uur op, de contrastvloeistof wordt ingespoten via een ader in de arm.

Je krijgt tijdens het onderzoek Buscopan® toegediend. Daar kan je tijdelijk een wazig zicht van krijgen. Dit zal snel weggaan na het onderzoek.

Na het onderzoek

- Je mag gewoon eten en drinken, medicatie innemen en al je activiteiten hervatten.
- Hou er rekening mee dat je nog een tweetal dagen last kan hebben van diarree, krampen en misselijkheid. Dit komt door het laxerende effect van de suikeroplossing.
- Je hoeft niet te wachten op de resultaten van het onderzoek, tenzij de verpleegkundige dit expliciet vraagt. De resultaten worden verstuurd naar jouw huisarts en voorschrijvende arts. Zelf kan je de beelden en verslagen raadplegen via Mynexuzhealth.

Contactgegevens bij vragen

Heb je na het lezen van deze folder toch nog bijkomende vragen? Stel ze dan gerust! Je kan de dienst medische beeldvorming contacteren via 03 380 20 60 tussen 8.00 en 17.15 uur.

Neem ook zeker een kijkje op onze website www.azvoorkempen.be. Je vindt er meer praktische informatie terug over je ziekenhuisfactuur, aanmelden en inschrijven in het ziekenhuis, parkeren ...



AZ Voorkepen
algemeen ziekenhuis
emmaüs