

Punctie hals-oxsel-lies

Jouw veiligheid is belangrijk

Neem je bloedverduuners? Gelieve dan zo snel mogelijk telefonisch contact op te nemen met de dienst medische beeldvorming, op het nummer 03 380 20 60.

Breng de (meest recente) beeldvorming van de te onderzoeken regio (hals-oxsel-lies) mee zodat de radioloog de juiste plaats van de afwijking kan bestuderen.

Over het onderzoek zelf

Er is bij jou een letsel in de hals, lies of oksel waargenomen dat verder moet worden onderzocht.

Onder echogeleide bepaalt de radioloog eerst de juiste plaats voor de biopsie. De huid wordt daarna plaatselijk verdoofd en men maakt een klein sneetje in de huid. Onder echogeleide wordt de (biopsie)naald op de plaats van het letsel gebracht en worden er enkele stukjes weefsel en/of cellen weggenomen. Om er zeker van te zijn dat er voldoende weefsel en/of cellen zijn weggenomen, wordt er meerdere malen geprikt.

De kleine insteekwonde wordt dichtgeplakt met steristrips en een pleister. Soms ontstaat er een hematoom (= blauwe plek) op de plaats van de punctie.

Na het onderzoek

- Druk bij bloeding of zwelling op de punctieplaats.
- Verwijder de pleister en steristrips pas na enkele dagen.
- Neem indien nodig een pijnstiller type dafalgan® (paracetamol). Gebruik zeker geen aspirine® of NSAID's. Deze medicatie verhoogt de kans op het optreden van een eventuele bloeding.
- Raadpleeg onmiddellijk je arts bij koorts of indien het gebied rond de punctieplaats rood, warm of gezwollen aanvoelt.

De uitslag wordt opgestuurd naar de voorschrijvende arts.

Contactgegevens bij vragen

Heb je na het lezen van deze folder toch nog bijkomende vragen? Stel ze dan gerust! Je kan de dienst medische beeldvorming contacteren via 03 380 20 60 tussen 8.00 en 17.15 uur.

Neem ook zeker een kijkje op onze website www.azvoorkempen.be. Je vindt er meer praktische informatie terug over je ziekenhuisfactuur, aanmelden en inschrijven in het ziekenhuis, parkeren ...

